



Україна, 04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд.6, тел. (063)700-51-59, (044)334-51-58
email: clinishtar@gmail.com Код ЄДРПОУ 42357767

Підготовка до ректосигмоскопії та оперативних проктологічних втручань (операції проктолога)

Мікроклізму потрібно зробити два рази : 1-ша ввечері напередодні дня операції, 2-га за 2-3 години до проведення операції .

мікроклізму «Енема-селла» або «Адюлак», “Мікролак”

Мікроклізми (одноразова клізма)

Препарат при ректальному введенні діє, як сольовий проносний засіб. Накопичення рідини в нижньому відділі кишечника спричиняє наповнення і сприяє перистальтиці та рухливості кишечника, спричиняє випорожнення лише прямої, сигмовидної та частини або всієї низхідної ободової кишки.

Випадки, що потребують очищення товстого кишечника, наприклад, перед проктоскопією, сигмоїдоскопією.

У разі випорожнень внаслідок прийому цього лікарського засобу слід пити багато рідини для запобігання дегідратації, особливо при захворюваннях, що можуть призводити до дегідратації, або у разі прийому лікарських засобів, що можуть зменшити швидкість клубочкової фільтрації, наприклад, діуретики, інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту